

Uzun Bacak | Black-winged Stilt

Himantopus himantopus

Uzun Bacak kızıl bacakları sayesinde hemen göze çarpar. 40 cm'e varan boyunun %60'ı bacaklarıdır. Tüm siğ göl ve bataklıklarda görülebilir. Örümcek, yumuşakça, böcek, balık yumurtası, tohum, sinek larvaları da dahil pek çok değişik canlıyı yiyerek beslenir.



Çok geniş bir dağılıma sahiptir. Kutuplar dışındaki tüm kıtalarda görülebilir. Kıbrıs'ta da hemen hemen tüm siğ sulak alanlarda görülen ve Kukla Sulak Alanı da dahil bazısında üreyen yaygın bir türdür. Adamızda üredikten sonra kalabalık gruplar oluşturup Kasım – Şubat döneminde kışlama alanlarına göçerler.

Çiftler yavrulara birlikte bakar. Yuva açık arazide toprak üzerine yapıldığından köpek ve tilki gibi hayvanların tehditine açıktır.

Sixty percent of the Black-winged Stilt's 40cm length is composed of its pink legs, distinguishing it from any other species. It inhabits shallow lakes and marshes, where it can feed on a wide diversity of food types including invertebrates, small vertebrates, fish eggs etc. Consequently, it has a very wide distribution; including all continents except the poles.

Black-winged stilt can be observed in almost all of the shallow wetlands of Cyprus and regularly breeds at a few sites including Kukla Wetlands. At the end of the breeding season they migrate back to their wintering grounds so they tend to leave Cyprus from November to February.

Pairs look after their offspring together. They nest on bare soil or a small mound in shallows, so their nests are prone to predation by fox and dogs.



"Kukla Sulak Alanı Kuş Gözlem Merkezi" Projesi KUŞKOR tarafından Beyarmudu Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilmektedir.

The "Hotspot for Bird Watchers" Project is implemented by KUŞKOR in partnership with Beyarmudu Belediyesi.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

This project is funded by the European Union.

